

# 藏兽医放血疗法的运用体会

索 多

(西藏阿里地区措勤县动物疫病预防控制中心, 西藏 阿里 859300)

**摘 要:**放血治疗在藏兽医学里已经广泛运用。在藏兽医历来辨证施治上,放血疗法属于“康木”,通常用静脉放血治疗。文章介绍了放血疗法的时间、放血地点、放血部位、适应症及具体操作方法。此疗法不仅适用于“赤巴”引起的“康木”疾病的治疗,还能达到预防各种疾病、增膘长体的奇妙作用。

**关键词:**藏兽医;放血;治疗

中图分类号:S854

文献标志码:B

## Application Experience of Bloodletting Therapy in Tibetan Veterinarians

Suoduo

(Animal Disease Prevention and Control Center of Cogen County in Ali of Tibet, Tibet Ali 859300, China)

**Abstract:** Bloodletting therapy has been widely used in Tibetan veterinary medicine. Based on the theory of “Long” “Chiba” and “Bacon”, Tibetan veterinarians classified the different diseases of livestock as “Kangmu” “Chu” and “Chammu”. Bloodletting therapy belongs to “Kangmu” and is usually treated by venous bloodletting. This paper introduced the time, place, area, indication and methods of bloodletting. This therapy is not only suitable for the treatment of “kangmu” disease caused by “Chiba”, but also to prevent various diseases and fatten up the body.

**Key Words:** Tibetan veterinary; bleeding; therapy

放血治疗在藏兽医学里已经广泛运用。在藏兽医历来辨证施治上,借鉴藏医理论“隆”“赤巴”“培根”的基础,根据牲畜所得疾病的不同,分别为“康木”“楚”“查木”三大因素,放血疗法属于“康木”,通常用静脉放血治疗。从古至今一般都用锋利的尖刀、坚骨通过高温消毒后刺入静脉进行放血,后来藏医学方面比较发达后,借鉴藏医学器械,寻找最好的铁,制作出具有实用价值并携带方便的弯刀或刺针。此疗法不仅适用于“赤巴”引起的“康木”疾病的治疗,还能达到预防各种疾病、增膘长体的奇妙作用。

## 1 放血时间、地点及要求

### 1.1 预防作用

根据古典记载,秋季的颈脉,初春的肾堂。这说明春季肾堂放血治疗,秋季颈静脉放血治疗效果明显。

### 1.2 治疗作用

根据文献记载,燕子北归之时或桃花盛开时,一般在3月底4月初,5天内服“七宝汤”或“三果汤”,待正血和病血分离后,左右肾堂放血,也可以左右颈静脉放血,血色变色即可止血,效果明显。

### 1.3 颈静脉均放血

入秋8月时,大约放出一碗血,可用颈脉用肾堂,强身健体作用大。这说明了藏兽医学对放血治疗的时间和部位做出了明确的指示。

收稿日期:2021-07-22

作者简介:索多(1984-),男,中级兽医师,主要从事兽医工作,

E-mail:suerduo@163.com。

## 1.4 放血部位

### 1.4.1 肾堂

主要用于治疗春季热性或寒性引起的各种病症,紊乱热、尿禁、毒性病症,通过放血来缓解机体的热、寒、毒引起的病症。

### 1.4.2 颈静脉

主要用于预防各种疾病,起到增膘保膘的目的,也可以用来治疗。

## 1.5 放血地点

家畜隔离远处,选择沙地放血。

## 2 适应症

适用于“赤巴”和“培根”引起的“康木”“楚”“查木”三大病症。

### 2.1 热病类

伤热、散热、紊乱热;疫病性热、“赤巴”引起的炎症;毒性病,热毒,高热病。

### 2.2 寒病类

寒病引起的冷毒、尿禁、腹痛;“赤巴”引起的不消化、腹胀等;增膘长体的保健,预防和控制热性病毒和毒病。

经过多年实践证明,以上病种都宜用藏兽医放血疗法。于藏医人医相比,在藏兽医领域更便于运用此疗法,风险小、效果明显、成本低,广大藏族群众更容易接受。

## 3 适应畜群

适合于两岁以上的马属动物、牦牛、藏牛、绵山羊、猪、骆驼、家犬。

## 4 禁忌症

放血疗法不适宜各类“隆”病引起的病症,如神志不清、四肢麻木、妊娠期的母畜、刚出生不到两个月的幼畜以及不到两岁的羊羔。

## 5 放血操作过程

### 5.1 口服汤药

“土木香七味汤”。通用名:“七宝汤”,处方:诃子1 500 g,余甘子1 500 g,毛诃子1 500 g,藏木香

1 000 g,宽筋藤1 000 g,干姜250 g,悬钩子500 g,制成粉末,加水适量煎汤。主治:流感、热性传染病。用法用量:口服3~5日,每日1~2次,马、牛30~50 g,猪、羊5~7 g。

也可以使用“三果汤”(诃子1 500 g,余甘子1 500 g,毛诃子1 500 g)。此方剂成本更低,制法、使用方法与“七宝汤”相同,主治疗效稍逊于“七宝汤”,按实际条件选择方剂制作和使用。

### 5.2 绑缚

家畜站立姿势或侧卧姿势绑定好,绑定架绑定的效果最佳。

### 5.3 消毒

所需放血刺针、尖头手术刀、放血部位均需用75%酒精严格消毒。操作员带好防护口罩和医用手套。

### 5.4 放血

放血时,兽医技术员站在家畜的侧面,找准放血部位,准确刺破血管三分之一深度进行放血。

### 5.5 注意事项

操作时注意兽医和绑定人员安全,防止出现意外。